



FOKKAMEL PLUS

CERTIFIED the art of growing

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FOKKAMEL PLUS es un sustituto lácteo para terneros en base a ingredientes de alta calidad. Diseñado para una crianza fácil y segura, ofrece vitaminas y minerales que satisfacen los requerimientos de los terneros. **Fokkamel Plus** es una excelente solución para criar terneros en forma eficiente.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Acidificado → acción antibacteriana
- ✓ Alto contenido lácteo
- ✓ Adecuado para sistemas con baldes o alimentadores automáticos
- ✓ Crianza segura

Proteínas seleccionadas

Solubilidad – Digestibilidad – Estabilidad

- Ausencia de factores anti-nutricionales
- Excelente solubilidad (NSI) y estabilidad
- Óptima digestibilidad

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES		
Proteína	%	21,0
Grasa	%	17,0
Ceniza	%	8,0
Fibra	%	0,2
Humedad	%	máx. 4,0
pH		5,5-5,8
Lactosa	%	42,5
Ácido láctico	%	1,0
Lisina	%	1,75
Metionina	%	0,44
Treonina	%	1,00
Nutrientes fitogénicos	ppm	20
Omega-3 (ALA)	ppm	2750
PROBIÓTICOS EN FÓRMULA INVIERNO		
Bacillus licheniformis	CFU/kg	0.65 x 10 ⁹
Bacillus subtilis	CFU/kg	0.65 x 10 ⁹
Enterococcus faecium	CFU/kg	2.50 x 10 ⁹
Recuento total bacterias	CFU/kg	3.80 x 10 ⁹

ADITIVOS		
ANTIOXIDANTES		
BHT	ppm	25
VITAMINAS		
Vitamina A	IU/kg	25000
Vitamina D	IU/kg	4500
Vitamina E	mg/kg	300
Vitamina C	mg/kg	300
Vitamina B1	ppm	16
Vitamina B2	ppm	10
Vitamina B6	ppm	10
Vitamina B12	ppb	80
Vitamina K	ppm	5,5
Ácido fólico	ppm	1,0
Ácido pantoténico	ppm	23
Niacina	ppm	50
OLIGOELEMENTOS		
Fe	ppm	150
Zn	ppm	170
Mn	ppm	40
Cu	ppm	10
I	ppm	1,3
Se	ppm	0,4





FOKKAMEL PLUS

CERTIFIED the art of growing

EMPAQUE

FOKKAMEL PLUS se presenta en sacos de 25 kg

ALMACENAJE

- ✓ Evite almacenar este producto en ambientes cálidos y manténgalo siempre alejado de la exposición directa a los rayos solares.
- ✓ Nunca almacene el producto en áreas húmedas o cerca de fuentes de agua.
- ✓ Asegúrese de que el área de almacenaje esté siempre limpia y libre de insectos.

MANEJO DE LOS TERNEROS

- **Calostro → entregar calostro de alta calidad:**
 - 1) lo antes posible
 - 2) la mayor cantidad posible
 - 3) lo más seguido posible
- **La temperatura óptima para beber es de 39°C. Verifíquela cuidadosamente.** Para preparar el sustituto se recomienda disolver el polvo en 2/3 del volumen total de agua requerida a 50 a 60° C. Después agregar la cantidad de agua restante a temperatura ambiente. Nunca disuelva en agua a más de 60° C.
- Administre concentrado desde el tercer día de vida en adelante. Entregue pequeñas cantidades al comienzo, aumentando según el consumo. Cambie el alimento con regularidad. Los terneros se pueden destetar una vez que consumen más de 1,5 kg de concentrado al día.
- Controle con regularidad el color y solidez de las heces.
- La higiene es esencial: limpie cuidadosamente con detergente todos los materiales que están en contacto con la leche.
- Mantenga siempre agua potable fresca disponible desde el tercer día de edad.
- Entregue forraje en forma de heno o paja picada.

- Los sistemas automáticos de alimentación deben ser calibrados en forma regular. Conviene programar la temperatura del agua a 42°C y verificar con frecuencia.

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN

Proporción mezcla = 145 + 1L de agua (125 g / L de sustituto preparado)

Temperatura de toma = 39° C

La temperatura de dilución no debe exceder los 60° C

ESQUEMA ALIMENTACIÓN		
Edad	Calostro	
1ª toma	antes de 4 horas post parto – 4L	
2ª toma	antes de 12 horas post parto – 2,5 L	
	Fokkamel Plus L / ración	Raciones / día
día 2-7	2	2
semana 2	2,5	2
semana 3	3	2
semana 4	3	2
semana 5	3	2
semana 6	3	2
semana 7	2,5	2
semana 8	2	2
semana 9	1	2

- Nuestro esquema de alimentación es una guía. La cantidad de sustituto debe ajustarse a las necesidades de los terneros
- Como regla general, los terneros deben tomar 10 de su peso corporal/día durante la primera semana (por ejemplo un ternero de 40 kg necesita 4 L/día)

